

[Nowa, skuteczniejsza profilaktyka raka szyjki macicy \[1\]](#)

Klasyczna cytologia lub badanie molekularne w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka onkogennego (HPV HR) – to nowe zasady diagnostyki w Programie profilaktyki raka szyjki macicy. Kobieta b?dzie mog?a wybra? jedno z tych bada?. Program profilaktyki raka szyjki macicy jest skierowany do kobiet w wieku 25-64 lat.

Wybierz jedno z dwóch bada?

Zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia, Program profilaktyki raka szyjki macicy zosta? poszerzony o diagnostyk? molekularn? wirusa HPV HR. Nowo?ci? jest fakt, ?e pacjentka ma do wyboru jedno z dwóch rodzajów bada? w tym programie:

- cytologi? konwencjonaln? (dotychczas standardowo stosowan? w profilaktyce raka szyjki macicy)
- lub badanie molekularne w kierunku zaka?enia podtypami wirusa brodawczaka ludzkiego o wysokim ryzyku onkogennym (HPV HR). Dodatkowo u pacjentek z potwierdzonym w badaniu molekularnym zaka?eniem wirusem brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV HR) b?dzie wykonywana cytologia na pod?o?u p?yнным (z pobranego wcze?niej materia?u).

Jak wyja?nia dr n. med. Leszek Smor?g, ginekolog onkolog, kierownik Zak?adu Profilaktyki Onkologicznej ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii, nowe zasady pomog? w wyodr?bnieniu grupy wysokiego ryzyka - kobiet zaka?onych podtypami wirusa brodawczaka ludzkiego o wysokim ryzyku onkogennym, prowadz?cym do rozwoju raka szyjki macicy i monitorowaniu ich. – Czyli jeste?my w diagnostyce o krok wcze?niej ni? do tej pory – t?umaczy ginekolog onkolog.

Co nam mówi cytologia?

Regularnie (co 3 lata) wykonywana cytologia, polegaj?ca na pobraniu wymazu z szyjki macicy i mikroskopowej ocenie komórek nab?onka cz??ci pochwowej szyjki macicy, pozwala na wczesne wykrycie zmian przednowotworowych w czasie kiedy kobieta nie ma ?adnych niepokoj?cych objawów.

Co nam mówi diagnostyka HPV HR?

Badanie molekularne (pobierane w taki sam sposób jak cytologia) HPV HR, wprowadzane w wielu krajach zamiast lub oprócz badania cytologicznego, wskazuje na:

- Wynik dodatni, czyli wykrycie zaka?enia wirusem HPV HR, ?wiadczy o podwy?szonym ryzyku powstania stanów rakowych i raka szyjki macicy w przysz?o?ci lub wskazuje na ich obecno??. Nie jest jednak równoznaczny z diagnoz? choroby. W tym przypadku z pobranego wcze?niej od pacjentki materia?u b?dzie wykonane dodatkowo badanie cytologiczne (cytologia na pod?o?u p?yнным). Je?li wynik cytologii b?dzie prawid?owy, lekarz zaleci pacjentce ponowne badanie profilaktyczne po up?ywie 12 miesi?cy. Je?li w badaniu cytologicznym zostan? stwierdzone zmiany o charakterze dysplastycznym, lekarz skieruje pacjentk? na dalsz? diagnostyk?, tj. badanie kolposkopowe lub badanie kolposkopowe z pobraniem wycinka do badania histopatologicznego. W przypadku rozpoznania raka szyjki macicy lub innego schorzenia – pacjentka zostanie skierowana do leczenia specjalistycznego lub na dalsz? diagnostyk?.

- Ujemny wynik badania HPV HR oznacza, ?e w badaniu molekularnym nie stwierdzono zaka?enia wirusem HPV o wysokim ryzyku onkogennym. Pacjentka powinna wykona? kolejne badanie za 5 lat.

Jak rozumie? wyniki bada?

- Je?li pacjentka wybierze badanie cytologiczne, otrzyma wynik informuj?cy j? o tym, czy materia? do badania zosta? pobrany prawid?owo oraz, czy w pobranych komórkach stwierdzono zmiany dysplastyczne

(przednowotworowe) lub nowotworowe.

- Je?li pacjentka wybierze badanie molekularne w kierunku HPV HR, otrzyma wynik badania informuj?cy, czy w pobranym materiale stwierdzono obecno?? podtypów wirusa HPV o wysokim potencjale onkogennym, prowadz?cym do rozwoju raka szyjki macicy. Nie b?dzie w nim oceny cytologicznej komórek nab?onka szyjki macicy, bo nie jest to przedmiotem badania.

- Wchodzimy w now? er? profilaktyki. Mo?na powiedzie?, ?e test molekularny w kierunku HPV HR wyprzedza badanie cytologiczne - t?umaczy dr Leszek Smor?g. - Do tej pory badali?my, czy wirus wywo?a? zmiany w komórkach i te zmiany daj? efekt w postaci nieprawid?owej cytologii. Natomiast w tej chwili badamy, czy kobieta jest zaka?ona wirusem HPV, czyli wyodr?bniamy grup? pacjentek podwy?szonego ryzyka, u których dopiero ta nieprawid?owa cytologia mo?e wyst?pi? lub nie. Skuteczno?? testu w kierunku wirusa HPV jest bardzo wysoka. Je?eli rozpoznamy zmian? na etapie zaka?enia wirusem HPV, jest ona w stu procentach wyleczalna.

Gdzie wykona? badanie?

Z Programu profilaktyki raka szyjki macicy wed?ug nowych zasad b?dzie mo?na skorzysta? we wszystkich poradniach ginekologiczno-po?o?niczych oraz przychodniach POZ maj?cych podpisan? umow? z NFZ na realizacj? tego programu (prawie 2700 w ca?ej Polsce, w tym blisko 130 w województwie ?wi?tokrzyskim). Aktualnie placówki medyczne s? w trakcie zawierania umów z NFZ na wykonywanie tych ?wiadcze? zgodnie z nowymi wytycznymi. Profilaktyka raka szyjki macicy na nowych zasadach b?dzie dost?pna w ?wi?tokrzyskim Centrum Onkologii po wakacjach.

?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii w latach 2021-2022 bra?o udzia? w pilota?u bada? HPV - DNA prowadzonym przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sk?odowskiej – Curie – Pa?stwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Z tej nowej formy diagnostyki skorzysta?o wówczas 1400 mieszanek województwa ?wi?tokrzyskiego. Od czterech lat, jako jedyna placówka medyczna w Polsce, wykonuje w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy dwa badania cytologiczne (cytologi? konwencjonaln? i cytologi? na pod?o?u p?ynnym z mo?liwo?ci? pó?niejszej diagnostyki wirusa HPV). ?CO dysponuje w?asnym Zak?adem Patologii Nowotworów, posiadaj?cym akredytacj? Ministra Zdrowia w zakresie diagnostyki patomorfologicznej, licencj? Polskiego Towarzystwa Patologów, oraz III, najwy?szy stopie? referencyjno?ci.

[2]

Aktualno?ci

Source URL: <https://www.onkol.kielce.pl/pl/aktualnosci/nowa-skuteczniejsza-profilaktyka-raka-szyjki-macicy>

Links

[1] <https://www.onkol.kielce.pl/pl/aktualnosci/nowa-skuteczniejsza-profilaktyka-raka-szyjki-macicy> [2] https://www.onkol.kielce.pl/sites/default/files/galerie/524287250_1225464269380705_2720334121598457436_n.jpg