


Rak pęcherza moczowego (ICD10: C67)

Opracowanie: Zakład Epidemiologii i Walki z Rakiem
(wg stanu na dzień 12.12.2023 r.)


W województwie świętokrzyskim w 2020 roku odnotowano 284 zachorowania na raka pęcherza moczowego (223 mężczyzn i 61 kobiet). Najczęściej występującym typem histologicznym był rak urotelialny (50.0%), a następnie rak urotelialny brodawkowaty (44.0%). W strukturze zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem rak pęcherza moczowego stanowił 5.7% i był czwartą przyczyną zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn i ósmą u kobiet. Standaryzowany według wieku współczynnik zachorowalności dla mężczyzn wynosił 17.7/100 000 i 4.0/100 000 dla kobiet. Na przestrzeni ostatnich 22 lat trend czasowy zachorowalności dla mężczyzn wskazywał zróżnicowaną tendencję zmian. W latach 2000-2006 obserwowana była tendencja spadkowa z następującym wzrostem zachorowalności w latach 2006-2008 i spadkiem w latach 2008-2014. Po roku 2014 zachorowalność na raka pęcherza moczowego u mężczyzn zaczęła wzrastać aż do roku 2017. Trend zachorowalności dla kobiet miał stabilny przebieg. W analizowanym okresie wartość standaryzowanego według wieku współczynnika zachorowalności dla mężczyzn uległa obniżeniu o 17.5%, dla kobiet wzrosła o 14.0%.

W 2020 roku odnotowano 129 zgonów z powodu raka pęcherza moczowego (98 mężczyzn i 31 kobiet). W strukturze zgonów na nowotwory złośliwe ogółem rak pęcherza moczowego stanowił 4.1% i był piątą przyczyną zgonów z powodu nowotworów złośliwych u mężczyzn i dwunastą u kobiet. Standaryzowany według wieku współczynnik umieralności dla mężczyzn wynosił 6.9/100 000 i 1.5/100 000 dla kobiet. Na przestrzeni ostatnich 22 lat trend czasowy umieralności dla mężczyzn kształtował się na stabilnym poziomie z okresowymi wzrostami umieralności w latach 2000, 2008 oraz 2015-2016. Trend umieralności dla kobiet miał stabilny przebieg. W analizowanym okresie wartość standaryzowanego według wieku współczynnika umieralności dla mężczyzn uległa obniżeniu o 12.5%, natomiast dla kobiet wzrosła o 35.1%.


Zachorowania na raka pęcherza moczowego, województwo świętokrzyskie, 2020 rok




Zgony z powodu raka pęcherza moczowego, województwo świętokrzyskie, 2020 rok




Histopatologia raka pęcherza moczowego, województwo świętokrzyskie, 2020 rok



Zachorowania na raka pęcherza moczowego według płci i powiatów województwa świętokrzyskiego, 2020 rok




Zachorowania i zgony z powodu raka pęcherza moczowego według powiatów województwa świętokrzyskiego, 2020 rok



Zachorowalność i umieralność na raka pęcherza moczowego w 2020 roku według województw


	Zachorowalność								Umieralność							
	Mężczyźni				Kobiety				Mężczyźni				Kobiety			
	Liczba	ASR (WJ)*	CR**	Ryzyko skum.	Liczba	ASR (WJ)*	CR**	Ryzyko skum.	Liczba	ASR (WJ)*	CR**	Ryzyko skum.	Liczba	ASR (WJ)*	CR**	Ryzyko skum.
Dolnośląskie	480	16.33	34.44	5.52	143	3.74	9.50	1.02	280	9.16	20.09	4.10	91	1.81	6.05	0.78
Kujawsko-Pomorskie	329	16.50	32.81	4.92	92	3.69	8.63	0.87	211	10.20	21.04	4.12	75	2.52	7.03	0.86
Lubelskie	297	14.49	29.14	4.54	75	2.82	6.92	0.70	143	6.40	14.03	2.69	39	1.11	3.60	0.42
Lubuskie	166	17.35	33.78	5.47	49	4.33	9.45	1.03	92	9.13	18.72	4.29	20	1.37	3.86	0.50
Łódzkie	230	9.52	19.71	2.80	75	2.31	5.85	0.58	221	8.27	18.94	3.60	63	1.42	4.91	0.54
Małopolskie	284	9.05	17.14	2.68	71	1.72	4.04	0.47	280	7.86	16.90	3.84	88	1.67	5.01	0.69
Mazowieckie	514	9.94	19.79	3.24	172	2.39	6.08	0.68	410	7.20	15.78	3.27	115	1.29	4.06	0.51
Opolskie	150	14.75	31.63	4.50	46	3.51	9.08	0.88	95	8.33	20.03	3.68	17	1.34	3.36	0.34
Podkarpackie	206	10.36	19.79	3.43	56	2.34	5.16	0.60	144	6.36	13.83	3.25	33	0.97	3.04	0.43
Podlaskie	145	12.68	25.29	4.12	58	4.25	9.61	0.95	89	6.61	15.52	3.41	24	1.27	3.98	0.47
Pomorskie	361	16.70	31.60	4.93	120	4.57	9.96	1.12	183	7.61	16.02	3.72	56	1.60	4.65	0.65
Śląskie	645	13.80	29.69	4.17	230	3.80	9.85	1.01	375	7.34	17.26	3.28	96	1.37	4.11	0.48
Świętokrzyskie	223	17.73	37.19	5.09	61	3.98	9.68	0.90	98	6.91	16.34	2.99	31	1.54	4.92	0.55
Warmińsko-Mazurskie	185	14.35	26.63	4.53	53	3.15	7.30	0.85	114	8.47	16.41	3.69	27	1.22	3.72	0.49
Wielkopolskie	408	12.79	23.96	4.12	135	3.04	7.51	0.91	321	9.65	18.85	3.98	99	1.88	5.51	0.82
Zachodniopomorskie	263	15.53	31.96	5.05	100	4.64	11.49	1.19	146	8.11	17.74	3.95	41	1.44	4.71	0.68
Polska	4886	13.17	26.34	4.09	1536	3.19	7.76	0.83	3202	7.94	17.26	3.58	915	1.50	4.62	0.59

Zachorowalność na raka pęcherza moczowego według województw, 2020 rok, ASR (W)*




Źródło: onkologia.org.pl

Umieralność z powodu raka pęcherza moczowego według województw, 2020 rok, ASR (W)*




Źródło: onkologia.org.pl


Zachorowalność na raka pęcherza moczowego według płci i województw, 2020 rok, ASR (W)*




Zachorowalność i umieralność z powodu raka pęcherza moczowego według województw, 2020 rok, ASR (W)*



Trendy zachorowalności na raka pęcherza moczowego, województwo świętokrzyskie, ASR (W)*



Trendy umieralności z powodu raka pęcherza moczowego, województwo świętokrzyskie, ASR (W)*



* ASR (Age-standardized rate) – Standaryzowany (wg wieku) współczynnik zachorowalności/umieralności

** CR (Crude rate) – Surowy współczynnik zachorowalności/umieralności