

Informacja

Pacjentce..... wykonano dn.-.....-.....r

biopsję gruboigłową piersi

.....

Przebieg zabiegu:

- wykonany w znieczuleniu miejscowym,
- niewielkie nacięcie na skórze,
- pobranie kilku wycinków do badania histopatologicznego,
- założono opatrunek, który należy zdjąć następnego dnia, a nacięcie zdezynfekować i zabezpieczyć plastrem z opatrunkiem,
- po zabiegu pacjentka czeka około 2 godzin i opuszcza Zakład Diagnostyki Obrazowej za zgodą lekarza,
- niewielki ból jest normalnym zjawiskiem po wykonaniu biopsji i może być w różnym stopniu odczuwalny nawet przez kilka dni. Zażywać ogólnodostępne bez recepty środki przeciwbólowe, np.: APAP, Paracetamol, Ibuprom (dawkowanie wg załączonej ulotki, przy braku w wywiadzie uczulenia na dany lek),
- po biopsji może wystąpić zasinienie piersi lub ograniczony krwiak,
- można zastosować maść z heparyną np. Lioton 1000 (maść heparynowa 2 razy dziennie).

W przypadku utrzymujących się objawów lub podwyższonej temperatury proszę zgłosić się do Lekarza Rodzinnego lub gabinetu chirurgicznego Przychodni Onkologicznej, pokój nr 164, I piętro.

Jeżeli po biopsji jest jedynie punktowe przekrwienie i z upływem czasu nie powiększa się jest to normalna sytuacja.

Za około 2 - 3 tygodnie po wcześniejszym upewnieniu się telefonicznym pod nr 41-36-74-340 odbiera Pani wynik w Sekretariacie Chirurgii, I piętro (osobiście lub inna osoba w Pani imieniu za pisemnym upoważnieniem).

.....
podpis i pieczęć lekarza