

INFORMACJA DLA PACJENTA GABINETU BIOPSJI ASPIRACYJNEJ CIENKOIGŁOWEJ (BAC)

TERMIN WYKONANIA BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ:.....

GODZINA REJESTRACJI W DNIU BIOPSJI: 7:30

REJESTRACJA TELEFONICZNA: 11:00 – 14:00 tel. 41 367 42 87

PRZED BIOPSJĄ CIENKOIGŁOWĄ:

- należy zabrać ze sobą dowód osobisty,
- należy zjeść posiłek i napić się na 1 godzinę przed biopsją,
- należy przyjąć leki zlecone przez lekarzy specjalistów,
- o odstawieniu lub zmianie dawkowania leków decyduje lekarz specjalista,
- należy zdjąć ozdoby z szyi, jeżeli biopsja dotyczy ślinianek, tarczycy, węzłów chłonnych i innych zmian okolicy szyi,
- należy założyć ubranie, które nie będzie utrudniało dostępu do badanych obszarów ciała.

PO BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ NALEŻY:

- utrzymać jałowy plaster z opatrunkiem w okolicy nakłucia, np. Elastopor Steril do 2 godzin po biopsji,
- utrzymywać jałowy plaster z opatrunkiem uciskowym po opróżnieniu torbieli w piersi przez czas do 12 godzin po biopsji,
- w przypadku utrzymującego się krwawienia lub wysięku z miejsca po biopsji zmienić opatrunek,
- zastosować zimne okłady z lodu przez czas 15 – 30 min. wówczas, gdy w okolicy wkłucia wystąpi zaczerwienienie, obrzęk, bolesność, zasinienie,
- w przypadku wystąpienia gorączki, powiększenia obrzęku i bólu w okolicy wkłucia, utrzymującego lub potęgującego się ogólnego złego samopoczucia oraz innych niepokojących objawów należy zgłosić się do lekarza rodzinnego.

DOLEGLIWOŚCI I POWIKŁANIA ZWIĄZANE Z BIOPSJĄ CIENKOIGŁOWĄ:

- w czasie zabiegu może wystąpić bolesność, która trwa krótko i szybko ustępuje,
- po zabiegu może pojawić się siniak, krwiak, obrzęk, bolesność w miejscu wkłucia.

WARTO WIEDZIEĆ:

Biopsja to zabieg diagnostyczny, polegający na pobraniu materiału biologicznego z tkanek podejrzanych o zmiany chorobowe bardzo cienką, jednorazową igłą, o średnicy 0,4-0,5 mm. Podczas zabiegu wykonuje się od jednego do kilku nakłuć, pobierając przy tym komórki chorobowo zmienionego obszaru ciała, które następnie lekarz Zakładu Patologii Nowotworów ogląda przy użyciu mikroskopu.

- Do zabiegu nie stosuje się znieczulenia miejscowego, gdyż dolegliwości związane z podaniem znieczulenia są porównywalne lub większe od samej biopsji.
- Większość biopsji cienkoigłowych wykonuje się pod kontrolą aparatu USG.
- Wykonanie samego badania trwa kilkanaście do kilkudziesięciu sekund.
- Wyniki badania będą dostępne do odbioru u lekarza kierującego