

Zakład Mikrobiologii Klinicznej

POBIERANIE PRÓBEK KAŁU W KIERUNKU TOKSYN CLOSTRIDIODES DIFFICILE

Próbki powinny być pobierane we wczesnym okresie biegunki, przed rozpoczęciem antybiotykoterapii. Próbkę należy pobrać rano i dostarczyć ją do laboratorium do południa, tak by można było wykonać badanie tego samego dnia.

1. Kał przed pobraniem najlepiej oddać na papier toaletowy lub do basenu.
2. Łopatką przymocowaną do wieczka pojemnika pobrać ok. 3 ml kału płynnego lub grudkę wielkości dużego orzecha laskowego, przenieść do pojemnika. Szczelnie zamknąć, dokładnie opisać, dostarczyć do Zakładu Mikrobiologii Klinicznej.

Materiał do badania powinien być dostarczony do LMK najlepiej tuż po pobraniu. W przypadku gdy natychmiastowe dostarczenie próbki jest niemożliwe, kał należy przechowywać w temp. 2 - 8 ° C (dolna półka lodówki), max. do 18 godzin od pobrania. Informację o przechowywaniu próbki w lodówce umieścić na pojemniku.

Zakład Mikrobiologii Klinicznej

POBIERANIE PRÓBEK KAŁU W KIERUNKU TOKSYN CLOSTRIDIODES DIFFICILE

Próbki powinny być pobierane we wczesnym okresie biegunki, przed rozpoczęciem antybiotykoterapii. Próbkę należy pobrać rano i dostarczyć ją do laboratorium do południa, tak by można było wykonać badanie tego samego dnia.

1. Kał przed pobraniem najlepiej oddać na papier toaletowy lub do basenu.
2. Łopatką przymocowaną do wieczka pojemnika pobrać ok. 3 ml kału płynnego lub grudkę wielkości dużego orzecha laskowego, przenieść do pojemnika. Szczelnie zamknąć, dokładnie opisać, dostarczyć do Zakładu Mikrobiologii Klinicznej.

Materiał do badania powinien być dostarczony do LMK najlepiej tuż po pobraniu. W przypadku gdy natychmiastowe dostarczenie próbki jest niemożliwe, kał należy przechowywać w temp. 2 - 8 ° C (dolna półka lodówki), max. do 18 godzin od pobrania. Informację o przechowywaniu próbki w lodówce umieścić na pojemniku.

Zakład Mikrobiologii Klinicznej

POBIERANIE PRÓBEK MOCZU NA POSIEW

Najlepszym materiałem do badań jest próbka moczu z nocy (pierwsza poranna mikcja), z tzw. środkowego strumienia. Jałowy pojemnik do badania należy pobrać z Punktu Pobrań, Zakładu Mikrobiologii Klinicznej lub gabinetu lekarskiego.

1. Umyć ręce wodą i mydłem, osuszyć.
2. Dokładnie umyć okolice krocza (u mężczyzn po odciągnięciu napletka) wodą z mydłem, wypłukać resztki mydła strumieniem bieżącej wody, nie wycierać ręcznikiem, nie stosować środków dezynfekcyjnych.
3. Oddać pierwszy strumień moczu do muszli (około połowę zawartości pęcherza), a następnie 3 – 5 ml wprost do jałowego pojemnika.
4. Naczynie natychmiast zamknąć nie dotykając rękami jego brzegów ani wewnętrznej powierzchni nakrętki.
5. Na naczynie przykleić plaster z imieniem i nazwiskiem.

UWAGA!

Próbka moczu powinna być dostarczona do Punktu Pobrań w ciągu dwóch godzin od pobrania. Jeżeli jest to niemożliwe mocz należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C (dolna półka lodówki) nie dłużej niż 18 godzin. Niewłaściwe postępowanie z próbką uniemożliwia wykonanie wiarygodnego badania.

Zakład Mikrobiologii Klinicznej

POBIERANIE PRÓBEK MOCZU NA POSIEW

Najlepszym materiałem do badań jest próbka moczu z nocy (pierwsza poranna mikcja), z tzw. środkowego strumienia. Jałowy pojemnik do badania należy pobrać z Punktu Pobrań, Zakładu Mikrobiologii Klinicznej lub gabinetu lekarskiego.

6. Umyć ręce wodą i mydłem, osuszyć.
7. Dokładnie umyć okolice krocza (u mężczyzn po odciągnięciu napletka) wodą z mydłem, wypłukać resztki mydła strumieniem bieżącej wody, nie wycierać ręcznikiem, nie stosować środków dezynfekcyjnych.
8. Oddać pierwszy strumień moczu do muszli (około połowę zawartości pęcherza), a następnie 3 – 5 ml wprost do jałowego pojemnika.
9. Naczynie natychmiast zamknąć nie dotykając rękami jego brzegów ani wewnętrznej powierzchni nakrętki.
10. Na naczynie przykleić plaster z imieniem i nazwiskiem.

UWAGA!

Próbka moczu powinna być dostarczona do Punktu Pobrań w ciągu dwóch godzin od pobrania. Jeżeli jest to niemożliwe mocz należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C (dolna półka lodówki) nie dłużej niż 18 godzin. Niewłaściwe postępowanie z próbką uniemożliwia wykonanie wiarygodnego badania.

Zakład Mikrobiologii Klinicznej

POBIERANIE PRÓBEK PLWOCINY NA POSIEW

Do badania najlepiej nadaje się plwocina pobrana rano, przed posiłkiem.

Pacjent musi być dokładnie poinformowany o właściwym sposobie odkrztuszania plwociny.

1. Przepłukać jamę ustną przegotowaną wodą. Jeśli pacjent posiada protezę zębową należy ją wcześniej wyjąć.
2. Plwocinę odkrztusić bezpośrednio do jałowego naczynia tzw. moczówki. Próbką musi pochodzić z tzw. głębokiego kaszlu.
3. Naczynie zamknąć, dokładnie opisać, dołączyć skierowanie i niezwłocznie przesłać do Zakładu Mikrobiologii.

Materiał powinien być dostarczony do LMK w jałowej moczówce, w czasie do 2 godzin od pobrania, przechowywany w temperaturze pokojowej. Jeśli natychmiastowe dostarczenie próbki nie jest możliwe, należy przechowywać ją w lodówce, w temperaturze 2 - 8 °C do 18 h.

Zakład Mikrobiologii Klinicznej

POBIERANIE PRÓBEK PLWOCINY NA POSIEW

Do badania najlepiej nadaje się plwocina pobrana rano, przed posiłkiem.

Pacjent musi być dokładnie poinformowany o właściwym sposobie odkrztuszania plwociny.

4. Przepłukać jamę ustną przegotowaną wodą. Jeśli pacjent posiada protezę zębową należy ją wcześniej wyjąć.
5. Plwocinę odkrztusić bezpośrednio do jałowego naczynia tzw. moczówki. Próbką musi pochodzić z tzw. głębokiego kaszlu.
6. Naczynie zamknąć, dokładnie opisać, dołączyć skierowanie i niezwłocznie przesłać do Zakładu Mikrobiologii.

Materiał powinien być dostarczony do LMK w jałowej moczówce, w czasie do 2 godzin od pobrania, przechowywany w temperaturze pokojowej. Jeśli natychmiastowe dostarczenie próbki nie jest możliwe, należy przechowywać ją w lodówce, w temperaturze 2 - 8 °C do 18 h.